

Tabelle 4. Verbesserungsvorschläge

	HÄ (n = 106)	FÄ amb. (n = 83)	PP amb. (n = 187)	FÄ stat. (n = 60)	PP stat. (n = 19)	Trifft nicht zu (%)	ANOVA p	Kontrast HÄ vs. Spez.			Kontrast amb. vs. stationäre Spez.			Kontrast FÄ vs. PP		
								t	df	p	t	df	p	t	df	p
Ansprechpartner für HÄ und niedergelassene Spez. in Klinik zur kurzfrist. Krisenintervention	4.58±.90	3.24±1.82	3.46±1.71	3.42±1.59	3.11±1.94	16.2	<.001 ^a	-6.42	384	<.001	-.35	384	.730	-.20	384	.844
Telefonische Kurz-Fallkonferenz/zeitnahe Rücksprache mit einem Spezialisten	4.32±1.12	3.73±1.57	3.97±1.41	3.85±1.39	3.75±1.77	8.2	.083 ^a									
regelmäßige Supervisions- oder Balint-Gruppe	3.06±1.51	3.25±1.76	3.63±1.54	3.51±1.48	3.44±1.89	12.1	.064									
häufigere Fortbildungsangebote zu psychischen Behandlungsaspekten	3.54±1.39	2.62±1.69	2.93±1.54	3.27±1.53	3.65±1.62	16.8	.001	-2.21	381	.028	2.82	381	.005	1.41	381	.160
Praxisbezogene Fortbildung mit Möglichkeit zur Fallbesprechung	3.49±1.43	2.99±1.76	3.18±1.67	3.55±1.62	3.56±1.85	10.6	.152									
Weitergabe der Telefondurchwahl des behandelnden stationären Spezialisten	3.32±1.50	2.71±1.75	3.22±1.64	2.60±1.64	2.83±1.82	13.1	<.001	-2.32	398	.021	-.95	398	.341	1.45	398	.149
diagnostisches Screening-Instrument (vom Patienten auszufüllen, in 1–3 min auswertbar)	3.55±1.36	2.37±1.70	3.11±1.58	3.00±1.57	2.76±1.86	13.6	<.001 ^a	-3.79	396	<.001	.58	396	.563	1.02	396	.308
Koordinierungsstelle für ambulante Psychotherapieplätze	4.12±1.35	2.13±1.70	2.39±1.60	4.20±1.25	4.00±1.32	12.3	<.001 ^a	-4.81	402	<.001	7.85	402	<.001	.10	402	.918
Informationsstelle für Behandlungsmöglichkeiten	3.63±1.47	2.62±1.84	3.20±1.64	3.63±1.70	3.56±1.76	9.5	.001 ^a	-1.82	415	.069	2.71	415	.007	1.02	415	.309
feste Telefonsprechzeiten bei niedergel. Spez. (wie in psychoth. Sprechstunde)	3.69±1.50	2.68±1.76	2.84±1.69	3.48±1.70	3.26±1.69	10.6	<.001	-2.99	410	.003	2.46	410	.015	-.11	410	.91
Zweitmeinung: Überweisung zur Diagnostik und Therapieempfehlung in die (eigene) Klinik	3.36±1.40	2.82±1.70	3.02±1.55	3.26±1.64	2.88±1.62	11.4	.160									
kurzfristige Fallkonferenz mit einem Spezialisten in dessen/der eigenen Praxis	3.06±1.53	2.55±1.76	3.14±1.69	2.47±1.54	2.17±1.76	15.9	.007	-2.27	385	.023	-2.06	385	.04	.57	385	.568
kurzfristige Fallkonferenz mit einem Spezialisten in dessen/der eigenen Klinik	2.61±1.44	2.25±1.72	2.61±1.61	3.65±1.44	3.22±1.86	15.5	<.001 ^a	1.61	387	.107	4.14	387	<.001	-.15	387	.884

Zustimmung zu Verbesserungsvorschlägen als Mittelwert ± SD auf Likert-Skala 1 (würde kaum helfen) bis 5 (würde sehr helfen); Verbesserungsvorschläge gewichtet absteigend sortiert; HÄ, Hausärzte; FÄ, Fachärzte; PP, psychologische Psychotherapeuten; amb., ambulant tätig; stat., stationär tätig; Spez., FÄ und PP zusammen; ANOVA mit $df=4$; ^aLevene-Test auf Varianzhomogenität signifikant; p =Brown-Forsythe.